

Vleeskuiken
Resultaten
& Voedings
Supplement

Cobb500™

vleeskuiken

cobb-vantress.com



Introductie

Deze uitgave bevat zowel de technische als de slachterij doelstellingen voor uw Cobb500 vleeskuikens samen met de nutritionele aanbevelingen om deze doelstellingen te behalen.

Vleeskuiken resultaten verschillen sterk tussen de onderlinge landen. De groeiresultaten zijn de streefwaarden voor het bereiken van een kosten-efficiënte technische resultaten.

Wanneer u vragen heeft over het samenstellen van een programma voor uw specifieke omstandigheden, gebaseerd op dit supplement en de algemene Cobb vleeskuikenmangementids, dan kunt u altijd contact opnemen met de lokale technische vertegenwoordiger van Cobb.

Cobb500 Vleeskuikenresultaten & Voedingssupplement

Normen

GEMENGD

Leeftijd dagen	Gewicht voor leeftijd (g)	Daggroei (g)	Gemiddelde Dag Groei (g)	Cumulatieve Voerconversie	Dagelijkse Voeropname (g)	Cumulatieve Voeropname (g)
0	42	0				
1	56	14		0,232	13	13
2	72	16		0,417	17	30
3	89	17		0,573	21	51
4	109	20		0,679	23	74
5	131	22		0,773	27	101
6	157	26		0,841	31	132
7	185	28	26,4	0,902	35	167
8	215	30	26,9	0,958	39	206
9	247	32	27,4	1,012	44	250
10	283	36	28,3	1,053	48	298
11	321	38	29,2	1,097	54	352
12	364	43	30,3	1,126	58	410
13	412	48	31,7	1,150	64	474
14	465	53	33,2	1,165	68	542
15	524	59	34,9	1,177	75	617
16	586	62	36,6	1,191	81	698
17	651	65	38,3	1,206	87	785
18	719	68	39,9	1,221	93	878
19	790	71	41,6	1,235	98	976
20	865	75	43,3	1,250	105	1081
21	943	78	44,9	1,264	111	1192
22	1023	80	46,4	1,284	117	1309
23	1104	81	47,8	1,303	123	1432
24	1186	82	49,3	1,321	130	1562
25	1269	83	50,8	1,337	134	1696
26	1353	84	52,1	1,356	141	1837
27	1438	85	53,6	1,373	148	1985
28	1524	86	54,4	1,402	152	2137
29	1613	89	55,6	1,423	158	2295
30	1705	92	56,8	1,442	163	2458
31	1799	94	58,0	1,460	169	2627
32	1895	96	59,2	1,478	174	2801
33	1993	98	60,4	1,496	180	2981
34	2092	99	61,5	1,512	182	3163
35	2191	99	62,6	1,530	189	3352
36	2289	98	63,6	1,549	193	3545
37	2386	97	64,5	1,568	197	3742
38	2482	96	65,3	1,589	201	3943
39	2577	95	66,1	1,610	205	4148
40	2671	94	66,8	1,631	209	4357
41	2764	93	67,4	1,653	213	4570
42	2857	93	68,0	1,675	216	4786
43	2950	93	68,6	1,697	220	5006
44	3043	93	69,2	1,718	222	5228
45	3136	93	69,7	1,739	225	5453
46	3229	93	70,2	1,759	227	5680
47	3322	93	70,7	1,779	231	5911
48	3414	92	71,1	1,800	233	6144
49	3506	92	71,6	1,819	235	6379
50	3596	90	71,9	1,840	237	6616
51	3685	89	72,3	1,860	239	6855
52	3773	88	72,6	1,880	240	7095
53	3859	86	72,8	1,901	242	7337
54	3944	85	73,0	1,922	243	7580
55	4028	84	73,2	1,943	245	7825
56	4111	83	73,4	1,963	245	8070
57	4192	81	73,5	1,984	245	8315
58	4272	80	73,7	2,004	245	8560
59	4350	78	73,7	2,024	245	8805
60	4427	77	73,8	2,044	245	9050
61	4502	75	73,8	2,065	245	9295
62	4576	74	73,8	2,085	245	9540
63	4649	73	73,8	2,105	245	9785

Cobb500 Vleeskuikenresultaten & Voedingssupplement

Normen

HENNEN

Leeftijd dagen	Gewicht voor leeftijd (g)	Daggroei (g)	Gemiddelde Dag Groei (g)	Cumulatieve Voerconversie	Dagelijkse Voeropname (g)	Cumulatieve Voeropname (g)
0	42	0				
1	56	14		0,232	13	13
2	72	16		0,417	17	30
3	89	17		0,573	21	51
4	109	20		0,679	23	74
5	130	21		0,776	27	101
6	156	27		0,841	31	132
7	184	27	26,3	0,908	35	167
8	214	30	26,8	0,953	37	204
9	244	30	27,1	1,016	44	248
10	280	36	28,0	1,053	47	295
11	318	38	28,9	1,098	54	349
12	360	43	30,0	1,127	57	406
13	408	48	31,4	1,150	63	469
14	460	53	32,9	1,166	68	537
15	520	60	34,7	1,173	73	610
16	582	62	36,4	1,184	79	689
17	646	64	38,0	1,197	84	773
18	711	65	39,5	1,212	89	862
19	777	66	40,9	1,228	92	954
20	844	67	42,2	1,246	98	1052
21	914	70	43,5	1,263	103	1155
22	986	72	44,8	1,284	111	1266
23	1060	74	46,1	1,304	116	1382
24	1136	76	47,3	1,326	124	1506
25	1214	78	48,6	1,344	126	1632
26	1294	80	49,8	1,365	134	1766
27	1378	84	51,0	1,385	142	1908
28	1463	85	52,2	1,403	144	2052
29	1549	86	53,4	1,422	151	2203
30	1636	87	54,5	1,441	155	2358
31	1724	88	55,6	1,461	161	2519
32	1813	89	56,7	1,479	163	2682
33	1903	90	57,7	1,496	165	2847
34	1993	90	58,6	1,512	167	3014
35	2083	90	59,5	1,528	169	3183
36	2172	89	60,3	1,546	175	3358
37	2259	87	61,1	1,566	179	3537
38	2344	85	61,7	1,587	184	3721
39	2428	84	62,3	1,610	189	3910
40	2510	82	62,8	1,635	193	4103
41	2591	81	63,2	1,660	197	4300
42	2671	80	63,6	1,684	199	4499
43	2751	80	64,0	1,709	203	4702
44	2831	80	64,3	1,733	203	4905
45	2910	79	64,7	1,756	205	5110
46	2989	79	65,0	1,778	204	5314
47	3068	79	65,3	1,800	207	5521
48	3147	79	65,6	1,820	208	5729
49	3226	79	65,8	1,841	209	5938
50	3301	75	66,0	1,862	209	6147
51	3376	75	66,2	1,884	213	6360
52	3451	75	66,4	1,905	215	6575
53	3524	73	66,5	1,928	219	6794
54	3597	73	66,6	1,950	221	7015
55	3670	73	66,7	1,973	225	7240
56	3741	71	66,8	1,995	225	7465
57	3812	71	66,9	2,017	225	7690
58	3883	71	66,9	2,038	225	7915
59	3953	70	67,0	2,059	225	8140
60	4023	70	67,1	2,079	225	8365
61	4093	70	67,1	2,099	225	8590
62	4162	69	67,1	2,118	225	8815
63	4230	68	67,1	2,137	225	9040

Cobb500 Vleeskuikenresultaten & Voedingssupplement

Normen

HANEN

Leeftijd dagen	Gewicht voor leeftijd (g)	Daggroei (g)	Gemiddelde Dag Groei (g)	Cumulatieve Voerconversie	Dagelijkse Voeropname (g)	Cumulatieve Voeropname (g)
0	42	0				
1	56	14		0,232	13	13
2	72	16		0,417	17	30
3	89	17		0,573	21	51
4	109	20		0,679	23	74
5	131	22		0,771	27	101
6	157	26		0,841	31	132
7	186	29	26,6	0,898	35	167
8	217	32	27,1	0,949	39	206
9	250	33	27,8	1,000	44	250
10	286	36	28,6	1,046	49	299
11	324	38	29,5	1,089	54	353
12	368	43	30,6	1,121	59	412
13	416	48	32,0	1,144	64	476
14	470	54	33,6	1,162	70	546
15	528	58	35,2	1,180	77	623
16	590	62	36,9	1,197	83	706
17	656	66	38,6	1,213	90	796
18	727	71	40,4	1,228	97	893
19	803	76	42,3	1,242	104	997
20	884	81	44,2	1,255	112	1109
21	971	87	46,2	1,265	119	1228
22	1058	87	48,1	1,278	124	1352
23	1145	87	49,8	1,294	130	1482
24	1233	88	51,4	1,312	136	1618
25	1321	88	52,8	1,332	142	1760
26	1409	88	54,2	1,354	148	1908
27	1497	88	55,4	1,377	154	2062
28	1585	88	56,6	1,402	160	2222
29	1677	92	57,8	1,423	165	2387
30	1773	96	59,1	1,443	171	2558
31	1873	100	60,4	1,460	177	2735
32	1978	105	61,8	1,476	184	2919
33	2085	107	63,2	1,492	192	3111
34	2192	107	64,5	1,510	200	3311
35	2299	107	65,7	1,531	209	3520
36	2406	107	66,8	1,551	212	3732
37	2513	107	67,9	1,571	215	3947
38	2620	107	68,9	1,590	218	4165
39	2726	106	69,9	1,609	221	4386
40	2832	106	70,8	1,628	225	4611
41	2938	106	71,7	1,647	229	4840
42	3044	106	72,5	1,667	233	5073
43	3150	106	73,3	1,686	237	5310
44	3256	106	74,0	1,705	241	5551
45	3362	106	74,7	1,724	245	5796
46	3468	106	75,4	1,743	250	6046
47	3574	106	76,0	1,763	255	6301
48	3680	106	76,7	1,784	265	6566
49	3786	106	77,3	1,805	270	6836
50	3891	105	77,8	1,825	265	7101
51	3994	103	78,3	1,844	265	7366
52	4095	101	78,8	1,863	265	7631
53	4194	99	79,1	1,883	265	7896
54	4291	97	79,5	1,902	265	8161
55	4386	95	79,7	1,921	265	8426
56	4481	95	80,0	1,940	265	8691
57	4573	92	80,2	1,958	265	8956
58	4662	89	80,4	1,978	265	9221
59	4748	86	80,5	1,998	265	9486
60	4831	83	80,5	2,018	265	9751
61	4912	81	80,5	2,039	265	10016
62	4990	78	80,5	2,060	265	10281
63	5068	78	80,4	2,081	265	10546

Vleeskuikenvoeding

Adviezen minimum normen

		Startfase	Groeifase	Afmest 1	Afmest 2*
VOER HOEVEELHEID/dier		250 g	1000 g		
VOERPERIODE (dagen)		0 - 10	11 - 22	23 - 42	43 +
VOERSTRUCTUUR		Kruimel	Korrel	Korrel	Korrel
Ruw Eiwit	%	21-22	19-20	18-19	17-18
Omzetbare energie (AMEn[†])	MJ/kg Kcal/kg	12,59 3008	12,92 3086	13,26 3167	13,36 3191
Lysine	%	1,32	1,19	1,05	1,00
Verteerbaar Lysine	%	1,18	1,05	0,95	0,90
Methionine	%	0,50	0,48	0,43	0,41
Verteerbaar Methionine	%	0,45	0,42	0,39	0,37
Met + Cys	%	0,98	0,89	0,82	0,78
Verteerbaar Met + Cys	%	0,88	0,80	0,74	0,70
Tryptofaan	%	0,20	0,19	0,19	0,18
Verteerbaar Tryptofaan	%	0,18	0,17	0,17	0,16
Threonine	%	0,86	0,78	0,71	0,68
Verteerbaar Threonine	%	0,77	0,69	0,65	0,61
Arginine	%	1,38	1,25	1,13	1,08
Verteerbaar Arginine	%	1,24	1,10	1,03	0,97
Valine	%	1,00	0,91	0,81	0,77
Verteerbaar Valine	%	0,89	0,80	0,73	0,69
Isoleucine	%	0,88	0,80	0,71	0,68
Verteerbaar Isoleucine	%	0,79	0,70	0,65	0,61
Calcium	%	0,90	0,84	0,76	0,76
Beschikbaar Fosfor	%	0,45	0,42	0,38	0,38
Natrium	%	0,16-0,23	0,16-0,23	0,15-0,23	0,15-0,23
Chloor	%	0,17-0,35	0,16-0,35	0,15-0,35	0,15-0,35
Kalium	%	0,60-0,95	0,60-0,85	0,60-0,80	0,60-0,80
Linolzuur	%	1,00	1,00	1,00	1,00

[†] De AMEN waarden zijn gebaseerd op de Europese WPSA tabel van energiewaarden voor pluimvee 3de editie 1989.


* Als er een afmestvoer zonder anti coccidiostatica gevoerd wordt kan hetzelfde afmestvoer gebruikt worden.

Slachtrendementen

Borstvlees is afhankelijk van veel factoren maar het meeste invloed hebben gewicht, leeftijd en voeding.

Gewicht

- Bij elke leeftijd neemt het aandeel karkas of borstvlees toe als functie van levend gewicht.



Bovenstaande grafiek is een weergave van het percentage borstvlees (nuchtere gewichten) van dieren uit een representatief gemixed koppel geslacht op 48 dagen.

Voer, slachtrendementen en Economie

- Cobb data heeft laten zien dat het eiwitgehalte en de aminozuren percentages tot ongeveer 8% kan worden verhoogd om het borstvlees percentage te verhogen. De voerkosten per kg levendgewicht zullen hierdoor wel stijgen.
- Voor de meest optimale economische voerkosten per kg levend gewicht kunnen de aminozuren worden verlaagd alleen zal dit wel ten koste kunnen gaan van groei en voederconversie.
- Het exacte niveau van aminozuren zal afhangen van de kosten van grondstoffen en de waarde van de eindproducten (op slachterij niveau).
- De Cobb500 is een flexibel vleeskuiken dat zowel goede resultaten behaalt op lage nutriënten niveaus als een versnelde groei en hoger borstvlees percentage zal laten zien bij hogere aminozuren gehalten.
- Voor vragen over een geoptimaliseerd voer programma voor specifieke bedrijfsdoelen kunt u altijd contact opnemen met het technische service team van Cobb. De aanbevelingen in dit supplement vormen een gedegen basis voor een voerprogramma.

Cobb500 Vleeskuikenresultaten & Voedingssupplement

Slachtrendementen

Voorspelde slachtrendementen bij verschillende gewichten (% van levend gewicht)

GEMENGD

Gewicht g	% Karkas	% Borst vlees	% Hele Dij	% Hele Drumstick	% Vleugel
1600	71,91	21,25	14,49	9,00	7,51
1800	72,30	21,65	14,48	9,04	7,51
2000	72,69	22,05	14,48	9,09	7,51
2200	73,08	22,45	14,48	9,13	7,52
2400	73,47	22,85	14,48	9,17	7,52
2600	73,86	23,25	14,47	9,22	7,53
2800	74,25	23,65	14,47	9,26	7,53
3000	74,64	24,05	14,47	9,30	7,53
3200	75,03	24,45	14,47	9,35	7,54
3400	75,42	24,85	14,46	9,39	7,54
3600	75,81	25,25	14,46	9,43	7,55
3800	76,20	25,65	14,46	9,47	7,55
4000	76,59	26,04	14,46	9,52	7,55

HENNEN

Gewicht g	% Karkas	% Borst vlees	% Hele Dij	% Hele Drumstick	% Vleugel
1600	71,89	21,83	14,48	8,81	7,53
1800	72,32	22,36	14,43	8,83	7,51
2000	72,75	22,88	14,39	8,85	7,49
2200	73,18	23,40	14,34	8,87	7,47
2400	73,61	23,92	14,30	8,88	7,45
2600	74,04	24,44	14,25	8,90	7,43
2800	74,47	24,96	14,21	8,92	7,41
3000	74,90	25,48	14,16	8,94	7,39

HANEN

Gewicht g	% Karkas	% Borst vlees	% Hele Dij	% Hele Drumstick	% Vleugel
1600	71,93	20,84	14,46	9,15	7,48
1800	72,28	21,13	14,49	9,21	7,50
2000	72,63	21,41	14,53	9,28	7,51
2200	72,98	21,70	14,56	9,35	7,53
2400	73,33	21,99	14,60	9,41	7,55
2600	73,68	22,28	14,63	9,48	7,57
2800	74,03	22,57	14,67	9,54	7,59
3000	74,38	22,85	14,70	9,61	7,61
3200	74,73	23,14	14,74	9,68	7,63
3400	75,08	23,43	14,77	9,74	7,65
3600	75,43	23,71	14,81	9,81	7,67
3800	75,78	24,00	14,84	9,88	7,68
4000	76,13	24,29	14,88	9,94	7,70
4200	76,48	24,58	14,91	10,01	7,72
4400	76,83	24,86	14,95	10,07	7,74
4600	77,18	25,15	14,98	10,14	7,76
4800	77,53	25,44	15,02	10,20	7,78

- Het grillier aandeel wordt berekend waarbij poten en loopbeen vanaf de hak zijn verwijderd.
- Fillet % is een percentage van het levend gewicht.

Vleeskuikenvoeding

Verteerbare aminozuur ratio's

Aminozuren	Startfase 0-10 dagen	Groeifase 11-22 dagen	Afmest 1 23-42 dagen	Afmest 2 43- dagen
Lysine*	100	100	100	100
Methionine	38	40	41	41
Methionine + Cystine	75	76	78	78
Tryptofaan	16	16	18	18
Threonine	65	66	68	68
Arginine	105	105	108	108
Valine	75	76	77	77
Isoleucine	67	67	68	68

* Lysine het referentie aminozuur en deze is op 100% gezet.

Aanvullende niveau's van vitamines en sporen elementen (per ton)

		Startfase	Groeifase	Afmest 1 en 2
Vitamine A	(MIU)	10-13	10	10
Vitamine D3	(MIU)	5	5	5
Vitamine E	(KIU)	80	50	50
Vitamine K	(g)	3	3	3
Vitamine B1 (thiamine)	(g)	3	2	2
Vitamine B2 (riboflavine)	(g)	9	8	6
Vitamin B6 (pyridoxine)	(g)	4	3	3
Vitamine B12	(mg)	20	15	15
Biotine (mais samenstellingen)	(mg)	150	120	120
Biotine (tarwe samenstellingen)	(mg)	200	180	180
Choline*	(g)	500	400	350
Foliumzuur	(g)	2	2	1,5
Nicotine zuur	(g)	60	50	50
Pantotheen zuur	(g)	15	12	10
Mangaan	(g)	100	100	100
Zink	(g)	100	100	100
Ijzer	(g)	40	40	40
Koper	(g)	15	15	15
Jodium	(g)	1	1	1
Selenium	(g)	0,35	0,35	0,35

* Bij voorkeur de Choline direct toevoegen in de mixer in plaats van via een premix vanwege zijn hygroscopische eigenschappen.

Vitaminen en sporen elementen kunnen variëren afhankelijk van bron en leverancier. Boven genoemde getallen verwijzen naar o.a. gebruik van anorganische mineralen en een vitamines D3 bron.

MIU = miljoen internationale eenheden; KIU = duizend internationale eenheden; g = grammen; mg = milligrammen
Aanvullende niveau's van sporen elementen dienen altijd te worden gecontroleerd aan de hand van lokale regelgeving zodat de totale niveau's niet boven de wettelijke normen uitkomen (e.g. EU 1334/2003).

cobb-vantress.com